

Gemadol® Retard (Tramadol) **- når paracetamol ikke er nok**

28. november 2011

mistede dine patienter tilskuddet til glukosamin.

IRF anbefaler tillæg af **tramadol**, hvis patienten fortsat har smerter¹.

Gemadol® Retard - når mindre kan gøre det!

Startdosis 50 mg x 2.

Gemadol® Retard

Eneste retard i 4 forskellige styrker fra 50 - 200 mg



Hvis du vil vide mere...

Læs mere om Gemadol® Retard på Medas website.

Klik ind på www.meda.dk/sundhedspersonale og opret dig som bruger – det er nemt og hurtigt.

Du kan også kontakte Pernille Sommer Schneider på telefon 4452 8888 for mere information om Gemadol® Retard og glukosamin tilskuddet.

Forkortet produktinformation - Gemadol® Retard (tramadolhydrochlorid)

Indikationer: Behandling af moderate til stærke smerter. **Dosering: Voksne:** Initialet gives 50-100 mg to gange dagligt, morgen og aften. Denne dosis kan titreres op til 150-200 mg to gange dagligt afhængig af smertetilstanden. Dosering skal være den mindste dosis, der giver smertelindring. Kapslerne kan tages uafhængigt af måltider og sluges hele med vand. **Ældre:** Dosering som voksne. Hos patienter over 75 år kan der være en tendens til øget biotilgængelighed. En justering af dosis kan derfor blive nødvendig. **Børn:** Over 12 år: Dosering som voksne. Under 12 år: Gemadol® Retard er ikke undersøgt og frarådes derfor til denne patientgruppe. **Nedsat nyre- og leverfunktion:** Da udskillelsen af tramadol kan være forlænget hos patienter med alvorlig nyre- og/eller leverinsufficiens, kan behandling med Gemadol® Retard ikke anbefales. **Kontraindikationer:** Overfølsomhed over for den aktive substans eller hjælpestofferne. Bør ikke gives til patienter, som er akut intoksikeret med hypnotika, centralt virkende analgetika, opioider, psykotropiske stoffer eller alkohol. Gemadol® Retard bør ikke gives til patienter i behandling med MAO-hæmmere, eller som har fået MAO-hæmmere inden for de sidste 2 uger. Gemadol® Retard er kontraindiceret hos patienter, der lider af ukontrolleret epilepsi. Må ikke anvendes i forbindelse med narkotikaafvænnning. **Advarsler:** Risiko for udvikling af afhængighed er lav. Ved langtidsbehandling kan der udvikles tolerance, fysisk og psykisk afhængighed. Patienter med epilepsi bør kun behandles med tramadol, hvis der er afgørende grunde herfor. **Forsigtighedsregler:** Forsigtighed udvises ved behandling af patienter med alvorlig nyre- eller leverfunktionsnedsættelse, hovedlæsion, nedsat bevidsthed, forhøjet intracranieelt tryk, patienter i chok med risiko for kramper. Ved anbefalede doser er det usandsynligt, at Gemadol® Retard kan forårsage klinisk relevant respirationsdepression. Der bør imidlertid udvises forsigtighed ved samtidig indgift af CNS-sædende stoffer samt hos patienter med eksisterende nedsat respiration. **Interaktioner:** Tramadol kan forstærke virkningen af CNS-sedativas virkning på andre centralt virkende stoffer inklusiv alkohol. Kan øge risikoen for, at SSRI og TCAs, antipsykotika og lignende stoffer, udløser krampeanfald. Samtidig indgift af carbamazepin kan medføre nedsat analgetisk virkning. Der skal udvises forsigtighed ved samtidig behandling med warfarin. **Graviditet og amning:** Må ikke anvendes. **Trafikfarlighed: Mærkning:** Bilkørsel eller betjening af maskiner frarådes hvis patienten er påvirket. **Bivirkninger: Meget almindelige (> 10 %):** Kvalme, opkast og svimmelhed. **Almindelige (1-10 %):** Forstoppelse, hovedpine, døsighed, mundtørhed, hedeure, svedudbrud. **Ikke almindelige (< 0,1-1 %):** Træthed, brækforemørelser, oppustethed, hjertebanken, tachycardi, ortostatisk hypotension, synkope, kløe, nædefeber, udslett. **Sjældne (0,01- 1 %) og meget sjældne (<0,01 %):** Se fuldt produktresumé. **Overdosering:** Symptomer som ved andre centralt virkende analgetika. **Behandling:** Sædvanlige retningslinier følges. Naloxon kan modvirke effekten af tramadol. **Tilskud:** Generelt tilskud. **Udlevering:** A. **Pakninger og priser:** Gemadol® Retard depotkapsler 50 mg: 20 stk. kr. 48,50, 100 stk. kr. 212,20. 100 mg: 20 stk. kr. 95,05, 100 stk. kr. 322,20. 150 mg: 20 stk. kr. 130,55, 100 stk. kr. 462,65. 200 mg: 20 stk. kr. 157,60, 100 stk. kr. 593,70. Priserne er gældende pr. 31. oktober 2011. Priserne er inkl. recepturgebyr og moms.

Indehaver af markedsføringstilladelse: Meda AS, Solvang 8, 3450 Allerød. Det fulde produktresumé kan rekvireres hos Meda AS. Gemadol® Retard er et registreret varemærke.

Referencer:
1. IRF 3. oktober 2011

Forkortet produktinformation - paracetamol

Indikationer: Behandling af svage og kortvarige, akutte smerter. **Dosering: Voksne:** op til 4 g pr. døgn **Børn:** 50 mg/kg/døgn **Nedsat nyre- og leverfunktion:** Fordele og risici skal overvejes nøje ved brug til patienter med lever- og nyreinsufficiens. **Kontraindikationer:** Overfølsomhed over for den aktive substans eller hjælpestofferne. Svær leverinsufficiens. **Advarsler** og forsigtighedsregler: pga. risiko for overdosering bør man være opmærksom på samtidig anvendelse af andre lægemidler, som også indeholder paracetamol. Indtagelse af doser højere end det anbefalede indebærer risiko for meget alvorlig leverskade. I tilfælde af høj feber, tegn på sekundær infektion eller vedvarende symptomer udover 3 dage bør behandlingen reevalueres. Hos patienter med svækket ernæringstilstand på grund af alkoholmisbrug, anoreksi eller fejlnæring frarådes vedvarende brug og maksimale doser på grund af risiko for toksiske leverreaktioner. **Generelt kan vanemæssig brug af analgetika, specielt i kombination med andre analgetiske lægemiddelstoffer, føre til vedvarende nyrelæsion med risiko for nyresvigt. Interaktioner:** Metoclopramid og domperidon kan øge absorptionshastigheden af paracetamol. Colestyramin nedsætter absorptionen af paracetamol. Lægemidler med enzyminducerende effekt nedsætter biotilgængeligheden af paracetamol og risikoen for levertoksicitet forøges. Ved samtidig behandling med probenecid bør dosisreduktion overvejes, da probenecid næsten halverer paracetamolclearance. Paracetamol øger plasmakonzentrationen af chloramphenicol. Den antikoagulative effekt af warfarin og andre coumaringer kan øges ved langvarigt regelmæssigt dagligt indtag af paracetamol. **Graviditet og amning:** Kan anvendes. **Bivirkninger:** Sjældne (0,01- 1 %) og meget sjældne (<0,01 %): Se fulde produktresuméer. **Overdosering:** doser over ca. 7,5 g indebærer risiko for leverskade, eventuelt også leversvigt og død. **Behandling:** Antidot-behandling med N-acetylcystein er effektiv og bør startes øjeblikkeligt. **Lægemiddelformer:** brusetabletter, depottabletter, filmovertrukne tabletter, opløselige tabletter, oral opl., oral suspension, pulver til oral opl., smelte tabletter, suppositorier, tabletter. **Tilskud:** Generelt tilskud. **Udlevering:** B, HA18, HX18 **Pakninger:** Fra 10 stk. til 300 stk. Fra 60 ml til 200 ml **Priser:** Fra 32,75 kr. til 181,25 kr. Priserne er gældende pr. 31. oktober 2011. Priserne er inkl. recepturgebyr og moms.

Indehaver af markedsføringstilladelser: Actavis A/S, Alternova A/S, GSK Consumer Healthcare, Nycomed, Orifarm, Vitabalans. De fulde produktresuméer kan rekvireres hos Meda AS.

MEDA