

Værd at vide om
Glytrin[®]
(glyceryltrinitrat)
sublingual-spray



MEDA

Meda AS
Solvang 8
3450 Allerød
tlf. 44 52 88 88
info@meda.dk
www.meda.dk

MEDA

Sådan anvender du Glytrin®

Din læge har ordineret Glytrin® sublingual-spray mod hjertekramper. Det er vigtigt, at du følger lægens anvisninger og læser indlægssedlen i pakken inden brug.

I denne folder kan du finde supplerende oplysninger og få svar på de mest almindelige spørgsmål om Glytrin®.

Du kan læse mere om hjertet og hjertekramper på www.hjerteforeningen.dk.

På www.meda.dk finder du yderligere information om Glytrin® og vores øvrige produkter.



Tag den hvide plathætte af sprayflasken



Placér pegefingeren på den hvide top
Hold sprayflasken lodret nær munden
Det er ikke nødvendigt at trykke et
prøvepust først



Åbn munden, løft tungen og hold vejret
Tryk den hvide top hårdt ned én gang og
spray under tungen
Luk derefter straks munden
Sprayen skal ikke indåndes
Ét pust indeholder en nøjagtigt afmålt
medicindosis

Spørgsmål & Svar

Hvad er hjertekramper?

Hjertekramper (angina pectoris) kan opstå på grund af snævre blodkar i hjertets kranspulsårer og viser sig især i forbindelse med fysisk anstrengelse, kuldepåvirkning eller psykisk stress.

Hvad er Glytrin®?

Glytrin® anvendes til forebyggelse eller behandling af hjertekramper. Glytrin® er en sublingual-spray, hvilket betyder at den skal sprøjtes ind under tungen.

Hvad indeholder Glytrin®?

Glytrin® indeholder glyceryltrinitrat. Stoffet virker ved at udvide blodkarrene, så der kommer mere blod og ilt til hjertet, som derved bliver aflastet. Glytrin® indeholder smag af pebermynteolie og en smule alkohol.

Hvor meget Glytrin® må jeg tage?

Tag 1-2 pust (doser) ved anfald.
Du må højst tage 3 pust pr. anfald.
Glytrin® virker bedst, hvis du kan undgå at bruge det i 8-10 timer hvert døgn.

Hvor hurtigt virker Glytrin®?

Glytrin® virker i løbet af 1/2-1 minut.

Hvor længe virker Glytrin®?

Virkingen af Glytrin® varer fra 10 til 30 minutter.

Hvordan kan jeg bruge Glytrin® til at forebygge anfald?

Umiddelbart inden en begivenhed eller fysisk aktivitet, der kan udløse et anfald, skal du tage 1-2 pust (doser).

Giver Glytrin® bivirkninger?

Al medicin kan give bivirkninger, også Glytrin®. De mest almindelige er hovedpine, svimmelhed, kvalme, svaghedsfølelse og rødmen i ansigtet.

Må jeg køre bil, når jeg har taget Glytrin®?

Glytrin® kan nedsætte din reaktionsevne, så du bør ikke køre bil, når du lige har taget Glytrin®.

Må jeg drikke alkohol samtidig med, at jeg bruger Glytrin®?

Du bør undgå alkohol, da alkohol sænker blodtrykket og derfor kan forstærke virkingen af Glytrin®.

Må jeg tage Antabus samtidig med, at jeg bruger Glytrin®?

Glytrin® indeholder en lille mængde alkohol, under 100 mg pr. pust. Hvis du er i behandling med Antabus, bør du tale med din læge, inden du starter med Glytrin®.

Må jeg bruge Viagra, Cialis eller Levitra sammen med Glytrin®?

Nej. Disse midler mod impotens nedsætter blodtrykket. Hvis du bruger dem sammen med Glytrin®, bliver virkningen forstærket og blodtrykket falder kraftigt. Dette kan medføre livsfare.

Er der nogen, som ikke må tage Glytrin®?

Følgende persongrupper må ikke tage Glytrin®: Personer, der samtidig tager Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil) eller Levitra (vardenafil).

Personer med meget lavt blodtryk og/eller lav puls eller dårlig blodcirkulation.

Personer med allergi over for indholdsstofferne eller andre nitrater.

Hvor lang holdbarhed har Glytrin®?

Udløbsdatoen er trykt i bunden af flasken og gælder også efter, sprayflasken er taget i brug.

Hvordan skal Glytrin® opbevares?

Glytrin® skal opbevares under 25°C. Glytrin® må ikke opbevares i køleskab og skal beskyttes mod frost, sollys og direkte varme. Beholderen er en overtryksbeholder og må ikke brændes eller punkteres.

Glytrin® (glyceryltrinitrat), sublingualspray 0,4 mg/dosis. Kan købes uden recept. Følg vejledningen i pakken. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du ønsker yderligere information. **Anvendelse:** Behandling og/eller forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris). **Dosering og indgivelsesmåde:** Mundhulespray, sprøjtes under tungen. **Behandling:** Ved anfald tages 1-2 pust (doser), som sprøjtes under tungen, imens vejret holdes. Det anbefales ikke at tage mere end højst 3 doser pr. anfald. **Forebyggende behandling:** Lige inden en begivenhed eller fysisk aktivitet, der kan udløse anfald, tages 1-2 pust (doser) som sprøjtes under tungen, imens vejret holdes. Glytrin anbefales ikke til børn. **Forsigtighedsregler:** Motorkørsel, maskinbetjening samt indtagelse af alkohol bør undgås under behandling med Glytrin. **Må ikke bruges ved:** Meget lavt blodtryk og/eller lav puls eller dårlig blodcirkulation. Samtidig anvendelse af Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil) og Levitra (vardenafil). Allergi over for indholdsstofferne eller andre nitrater. **Bivirkninger:** Almindelige: Hovedpine, svimmelhed, svaghedsfølelse, kvalme, ansigtsrødmen. **Pakninger og priser:** Sublingualspray, opløsning 0,4 mg/dosis, 200 afmålte doser; ingen fast pris. **Læs indlægssedlen omhyggeligt før brug.**



MEDA